© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tausch-Catalog

der deutschen malakozoologischen Gesellschaft.

(NB. Die Preise in Reichsmark per Stück.)

Conchylien vom Rothen Meer.

	Mk		Mk
Cypraea turdus, Lam.	0,20	Lathirus turritus, Gmel.	1,—
— carneola, L.	0,20	— Forskalii, Tapp.	0,30
— camelopardalis, Perry	0,70	Jopas sertum, Brug.	0,40
— arabica, L.	0,20	Scolymus cornigerus, L.	0,50
— felina, Gmel.	0,40	Pleurotoma erythraea, Jick.	2-3,—
— fimbriata, Gmel.	0,40	Rostellaria curvirostris, Lam.	2,—
— pantherina, Sol. (klein. v.)	0,50	Strombus tricornis, Lam.	0,60
Mitra Rüppellii, Rve.	0,50	— fasciatus, Born.	0,40
— rotundilirata, „	0,30	— gibberulus, L.	
— harpaeformis, „	0,20	var. rhodostomus, Mart.	0,40
Columbella mendicaria, L.	0,10	— floridus, Lam.	0,40
— trifasciata, Rve.	0,30	— elegans, Sow.	0,50
— poecila, Sow.	0,30	Cerithium palustre, L., Brug.	0,40
Purpura hippocastanum, L.	0,30	Cerithium Ruppellii, Phil.	0,30
Coralliophila neritoidea, L.	0,60	— columna, Sow.	0,30
Ricinula anaxares, Duel.	0,40	— Kochi, Phil.	0,40
— bicatenata, Rve. var.	0,50	— tuberculatum, Lam.	0,20
— fiscellum, Chm.	0,40	— Caillandi, Pot und M.	0,10
— spectrum, Rve.	0,40	Triforis rubra, Hinds	0,40
Pyrula rapa, Lam.	0,50	— corrugata, „	0,40
— paradisiaca, Chm.	0,50	Trochus dentatus, Forsk.	0,60
Nassa arcularia, L.	0,10	— erythraeensis, Brocc.	40-1,—
— Rumphii, Desh.	0,40	Terebra babylonica, Lam.	0,80
Ranella granifera, Lam.	0,60	— nimbosa, Hinds	0,30
— concinna, Dkr.	0,70	— subulata, L.	0,30
Tritonium aquatile, Rve.	1,0	Oliva inflata, L.	0,30
— lotorium, L.	2,0	Ancillaria ventricosa, Lam.	0,50
Murex digitatus, Sow. besch.	3,—	— acuminata, Sow.	0,40
ditto nicht schön	6,—	Bulla ampulla, L.	0,20
— scolopax, Dillw.	3,—	Solarium perspectivum, L.	0,40
— erythraeensis, Fisch	80-1,50	— variegatum, Lam.	0,60
Fasciolaria inermis, Jonas	1-2,—	Litorina angulata, „	0,20
— trapezium, L.	1,—	Planaxis Savignyi, Desh.	0,10

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Mk		Mk
Pagodus natalensis, Krss.	0,20	Mactra olorina, Phil.	0,80
Turritella bicingulata, var.	0,30	Mesodesma glabrata, Lam.	0,20
Nerita albicilla, L.	0,20	Barbatia nivea, Chm.	50-0,80
— quadricolor, Gmel.	0,30	— Helblingi, „	0,40
— Rumphii, Recluz	0,20	— fusca, Brug.	0,60-80
Turbo Chemnitzianus, Rve.	0,50	Anomalocardia scapha, Chm.	40-1,—
Lunella modesta, Phil.	0,80	— holosericea, Rve.	60-1,—
Conus flavus, Lm.	0,40	Arca retusa, Lam.	50-0,80
— sumatrensis, Hwass.	1,50	— squamosa, „	30-0,50
— vicarius, Lam. (Klein)	0,40	Modiola auriculata, Krss.	0,40
Volvaria monilis, Lam.	0,15	Mytilus decussatus, Lam.	0,30
Natica mamilla, L.	0,30	— variabilis, Krss.	0,30
Pollia rubiginosa, Rve.	0,70	Malleus regula, Forsk.	0,80
Dentalium longirostrum, Rve.	2,—	Meleagrina fucata, Gould	2,—
Chiton Sueziensis, Issel	0,60	Spondylus aculeatus, Chm.	3,—
Ostrea? sp. (Prachtstück)	3,—	Cardita (Mytilicardia) varie-	
Venus nov. sp.?	3,—	gata, Brug.	0,80
Tylleria Vesti Jick.	6,—	Hyalea longirostris, Les	0,20
Tellina staurella, Lam.	0,50	Helix Darnaudi, Pfr.	0,50
— rugosa, Born	0,40	— melanostoma, Drp.	
Tellina foliacea, Lam.	1,20	Alexandria	0,60
— opalina, Sow.	0,50	Bul. abyssinicus, Rüp (todt)	
Asaphis violaceus, Forsk	0,40	Habab.	0,40
Ervilia scaliola, Issel	0,30	Pupa Klunzingeri, bisulcata,	
Cardium magnum, Born	0,80	lardea, Reinhardti, Jick.	
— vitellinum, Rve.	0,80	und fontana, Krauss	
Lucina exasperata, Rvé.	1,—	Abyssinia, alle à	0,50
Tellina fragilina, Issel	0,60	Succinea rugulosa, Mor.	60-0,80
Circe Savignyi, Jonas	0,50	Vitrina Isseli, Mor. var.	0,70
Tivela damaoides, Gray	20-1,—	Microcystis Vesti, Jick. 2 St.	0,50

NB. Bekanntlich sind die Rothe Meer-Conchylien oft stark bedeckt. Wer es liebt, denselben ein schönes Ansehen zu geben, braucht sie nur 1 bis 2 Tage in Chlorkalkwasser zu legen; die zarteren Muscheln bürstet man hiernach in heissem Seifenwasser mit verschiedenen Zahnbürsten und löst feste Ansätze mit feinen Messern, Nähnadeln etc.; die starkschaligen taucht man in kochendes Wasser, worin etwas Salzsäure gegossen ist, indess nur etliche Sekunden, und wäscht mit heissem Seifenwasser und Bürste nach. Durch Uebung lernt man bald, wie viel

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Chlorkalk und Salzsäure man nehmen darf; man fange mit wenig an, zumal von letzterer. Wer es liebt, kann, wenn trocken, noch mit feiner Lammswolle, die unbedeutend mit feinem Oel benetzt ist, abreiben. Bei zarten Individuen und wo die Epidermis erhalten werden soll, nehme man sich mit jeder Behandlung in Acht.

T. A. Verkrüzen,
Neue Mainzer Strasse 6, Frankfurt a. M.

Literaturbericht.

Journal de Conchyliologie. 1876. Nr. 3.

p. 217. *Watson, Rev. R. B.*, Note sur les coquilles terrestres communes a Madère et à d'autres contrées, considerées au point de vue de la distribution geographique.

Der Autor nimmt die Zahl der bekannten Arten nach Ausscheidung der zweifelhaften und der Strandbewohner mit 176 an, von denen 146 der Inselgruppe eigenthümlich sind, während nur 33 auch an andern Punkten vorkommen. Diese sind alle weitverbreitete Europäer mit Ausnahme von Vitrina Teneriffae, welche auch auf den Canaren vorkommt, Helix armillata Lowe und paupercula Lowe, welche mit den Azoren gemeinsam sind.

p. 232. *Fischer, P.*, Description d'un nouveau genre de Coquille des mers de la Chine (Hoplopteron, verwandt mit Scalaria).

p. 236. — —, Descriptions d'espèces nouvelles de l'Afrique occidentale (Murex hoplites, Arca despecta [Moussole Adans.], A. Bouvieri).

p. 240. *Morlet, A.*, Notes sur quelques Mollusques terrestres et fluviatiles de l'Alsace.

p. 242. *Lataste, F.*, sur des troncatures successives d'un Helix aspersa en forme de corne d'abondance.

p. 247. *Tribolet, M. de*, Note sur le genre Posidonomya, et en particulier sur les P. alpina Gras et P. ornati Quenst., suivie d'une liste des Posidonomyes jurassiques.

p. 257. *Fischer, P.*, Note sur les Coquilles des Chotts du Nord de l'Afrique. Es werden Cardium edule, Melania tuberculata und Melanopsis cariosa genannt, doch ist aus dem Texte nicht mit Bestimmtheit ersichtlich, ob C. edule im Schott el Melrir wirklich noch lebt.